


Schapenbrok conditie



8718481090336

Eigenschappen

- Voor alle productiefasen
- Ideale aanvulling op het ruwvoer

Voeradvies

Volwassen schapen buiten dracht- en zoogperiode kunnen afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer worden bijgevoerd met 200 tot 300g Schapenbrok conditie om te voorzien in noodzakelijke vitaminen en mineralen. Aan dragende ooien kan in de laatste maand van de dracht dagelijks 200 tot 550 g per dag Schapenbrok Conditie worden bijgevoerd. De benodigde hoeveelheid is het hoogst wanneer een twee- of drieling wordt verwacht. Als richtlijn voor het bijvoeren van zogende ooien kan worden aangehouden 600g per dag bij een eenling, 1kg per dag bij een tweeling en maximaal 1,5kg per dag bij een drieling. Zorg altijd voor voldoende ruwvoer van goede kwaliteit en voor vers en schoon drinkwater.



HOBBYVOEDERS ■ SPECIAALVOEDERS

www.voerwaarts.nl



Artikelnummer	11800
Gewicht	20kg
Volle pallet	50 x 20kg
Houdbaarheid na productie:	12 maanden
Versrijningsvorm:	Korrels, ø 5mm
Type voer:	

Aanvullend diervoer voor schapen

Samenstellingsindicatie:

(Suiker)Bietenpulp (4.1.10). Palmpitschilfers (2.12.10). Gerst (1.1.1). Zonnebloemzaadschroot. Mais (1.2.1). Raapzaadschroot (2.14.3). Maisgluten (1.2.8). Tarwe. (Suiker)bietenmelasse (4.1.4). Krijt/kalksteen. Lijnzaad (2.8.1). grasmaal (6.5.1). Zout. Ontsloten tarwebloem.

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 143.0 g. Ruw vet 32.0 g. Ruw celstof 107.0 g. Ruw as 75.0 g. Calcium 10.7 g. Fosfor 4.3 g. Lysine 5.4 g. Methionine 2.7 g. Natrium 3.5 g. Magnesium 3.6 g. Kalium 10.8 g.

Toevoegingsmiddelen:

Vitamine A Retinylacetaat (3a672a) 8.160 IE.
Vitamine D3 (3a671) 2.040 IE.
Vitamine E all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700) 15 mg.
FE. Ijzer-sulfaat-monohydraat (3b103) 20 mg. Mo. Na-molybdaat (E7) 2 mg.
I. Kaliumjodide (3b201) 1 mg. Mn. mangaan(II)oxide (3b502) 30 mg.
Zn. Zinkoxide (3b603) 70 mg. Zn. Zink-sulfaat-monohydraat (3b605) 70 mg.
Se. natriumseleniet (3b801) 0.2 mg.