


Schapenbrok Lacto



8718481092231

Eigenschappen

- Geschikt voor de laatste maand van de dracht.
- Geschikt voor zogende oaien

Voeradvies

De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van ras, buitentemperatuur en van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoer. Richtlijn: 100g per dag 4 tot 2 weken voor het werpen. 300g per dag vanaf 2 tot 1 week voor het werpen. 500g per dag laatste week van de dracht. Eerste week na aflammeren 1kg per dag. Daarna voerhoeveelheid afstemmen op aantal lammeren. Bij een ooi met eenlaing 700g per dag, bij een ooi met tweeling 1kg per dag. Maximaal 1,3kg per dag bij een drieling. Zorg altijd voor voldoende ruwvoer van goede kwaliteit en voor vers en schoon drinkwater.



HOBBYVOEDERS ■ SPECIAALVOEDERS

www.voerwaarts.nl



Artikelnummer	19900
Gewicht	20kg
Volle pallet	50 x 20kg
Houdbaarheid na productie:	12 maanden
Verschijningsvorm:	Korrels, ø 5mm
Type voer:	

Aanvullend diervoer voor schapen

Samenstellingsindicatie:

Gerst (1.1.1). (Suiker)Bietenpulp (4.1.10). Sojaschroot (2.18.4) 1. Palmpitschilfers (2.12.10). Maisgluten (1.2.8). Mais (1.2.1). Zonnebloemzaadschroot. (Suiker)bietenmelasse (4.1.4). Raapzaadschroot (2.14.3). Krijt/kalksteen. Lijnzaad (2.8.1). Tarwe.
(*) Geproduceerd van ggo-houdende soja

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 175.0 g. Ruw vet 28.0 g. Ruw celstof 86.0 g. Ruw as 78.0 g. Calcium 12.0 g. Fosfor 3.8 g. Lysine 8.3 g. Methionine 2.9 g. Natrium 2.7 g. Magnesium 3.5 g. Kalium 11.9 g.

Toevoegingsmiddelen:

Vitamine A Retinylacetaat (3a672a) 8.160 IE.
Vitamine D3 (3a671) 2.040 IE.
Vitamine E all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700) 15 mg.
FE. Ijzer-sulfaat-monohydraat (3b103) 20 mg. Mo. Na-molybdaat (E7) 2 mg.
I. Kaliumjodide (3b201) 1 mg. Mn. mangaan(II)oxide (3b502) 30 mg.
Zn. Zink-sulfaat-monohydraat (3b605) 70 mg.
Se. natriumseleniet (3b801) 0.2 mg.