



## Voerschema schapen

Voor uitvoerige informatie over schapenvoer in elke fase verwijzen we graag naar onze speciale pagina over schapenvoeding: [www.schapenvoer.nl](http://www.schapenvoer.nl).

Voor elk krachtvoer advies in onderstaand schema geldt dat er gecombineerd moet worden met weidegang of onbeperkt hooi of kuilvoer. Zorg daarnaast altijd voor onbeperkt fris water.

<b><u>Ooien zonder lammeren</u></b>	100 tot 150g <b>Schapenbrok Conditie</b> per ooi per dag
<b><u>In conditie brengen voor het dekken</u></b>	Probeer alle ooien naar een conditie tussen 2,5 en 3,5 conditiescore te krijgen. Hiervoor mag tot 500g <b>Schapenbrok Conditie</b> per ooi per dag worden verstrekt. Zie info over 'conditiescore' verderop in dit voerschema
<b><u>Flushen</u></b> <i>3 weken voor de ram er bij gaat tot 3 weken nadat de ram er bij zit.</i>	Geef de ooien een verse wei met royaal aanbod en voer 250g <b>Schapenbrok Lacto</b> per ooi per dag bij.
<b><u>Begin van de dracht</u></b>	Voer, afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer, 100 tot 150g <b>Schapenbrok Conditie</b> per ooi per dag bij.
<b><u>Einde van de dracht</u></b>	
<i>4 weken voor aflammeren</i>	Verstrek 150 – 200g <b>Schapenbrok Conditie</b> per ooi per dag naast weidegang of onbeperkt goed ruwvoer op stal.
<i>3 weken voor aflammeren</i>	Verstrek 300g <b>Schapenbrok Conditie</b> per ooi per dag naast weidegang of onbeperkt goed ruwvoer op stal.
<i>2 weken voor aflammeren tot aflammeren</i>	Zet de ooien op stal. Verstrek 400g <b>Schapenbrok Lacto*</b> per ooi per dag naast onbeperkt goed ruwvoer, eventueel tot 600g als een drieling wordt verwacht. Let extra op schimmellekken in het kuilvoer omdat dit verwerpen kan veroorzaken (Listeria). <i>*Voerwaarts Schapenbrok Lacto bevat natriumbicarbonaat wat bij kan dragen aan het voorkomen van pensverzuring.</i>
<b><u>Zogende ooien</u></b>	
<i>1e week na aflammeren</i>	Verstrek 1kg <b>Schapenbrok Lacto</b> per ooi per dag bij voorkeur verspreid over 3 voerbeurten
<i>2<sup>e</sup> week na aflammeren</i>	Stem de hoeveelheid <b>Schapenbrok Lacto</b> af op het aantal lammeren. Bij een ooi met een eenling 700g per dag, bij een ooi met een tweeling 1kg per dag en maximaal 1,3kg per dag bij een drieling (en verzorg het 3 <sup>e</sup> lam met kunstmelk). Geef in deze periode extra aandacht aan de beschikbaarheid van vers en schoon drinkwater. Een ooi die veel (droog) krachtvoer eet én veel melk produceert, heeft een grote behoefte aan drinkwater tot wel 10 liter per dag! Verstrek vanaf de 2 <sup>e</sup> week op een plek waar de ooien niet kunnen komen tot 150g <b>Lammerenkorrel Groei</b> per lam aan de lammeren.
<i>4<sup>e</sup> – 5<sup>e</sup> week na aflammeren</i>	Verminder de hoeveelheid <b>Schapenbrok Lacto</b> van de ooien bij een leeftijd van de lammeren van vier a vijf weken dagelijks met circa 5%.
<i>5 dagen voor speenmoment</i>	Geef de ooien met lammeren 5 dagen voor het spenen een schrale weide en stop met krachtvoer, ook als ze in schrale conditie zijn. Blijf indien mogelijk de lammeren wel bij voeren met 150 tot 250g <b>Lammerenkorrel Groei</b> per lam per dag.
<b><u>Lammeren op de wei</u></b>	Verstrek 150 tot 250 gram <b>Lammerenkorrel Groei</b> per lam per dag
<b><u>Lammeren op stal</u></b>	Lammeren die binnen worden afgemest, kunnen onbeperkt gevoerd worden met <b>Lammerenkorrel Groei</b> en structuurrijk ruwvoer zoals hooi of stro.




## Biest & kunstmelk

Het belang van biest kan niet genoeg worden benadrukt. Biest (of colostrum) is de eerste melk van een ooi die naast voedingsstoffen ook rijk is aan essentiële antistoffen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie de lammeren te weinig melk krijgen of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval is het zinvol om het derde lam op te fokken met kunstmelk. Als u twee gelijkwaardige lammeren bij de ooi houdt dan kan het derde lam volledig met kunstmelk groot worden gebracht. Dat kan dus het kleinste of juist het grootste lam zijn! Kunstmelk kan pas worden ingezet als het lam 24 uur voldoende biest heeft gehad.

<b>Dag 2 tot 4</b>	3 x daags <b>Novilam Lammerenmelk</b> zoveel als lam wil drinken
<b>Dag 5 tot 8</b>	3 x daags 400 cl <b>Novilam Lammerenmelk</b>
<b>Week 2</b>	2 x daags 700 cl <b>Novilam Lammerenmelk</b>
<b>Week 3</b>	2 x daags 1 L <b>Novilam Lammerenmelk</b>
<b>Week 4 t/m week voor spenen</b>	2 x daags 1,2L <b>Novilam Lammerenmelk</b>
<b>Laatste week voor spenen</b>	Afbouwen naar 1 x daags 400 cl <b>Novilam Lammerenmelk</b>

## Conditie score



De conditie van ooiën is het beste te bepalen als de ooiën geschoren zijn. De gewenste conditiescore voor een ooi is 3, te magere ooiën hebben een conditiescore lager dan 2 en te dikke ooiën vallen in de categorie 4-5. Score 3 houdt in dat de ruggengraat en de lendewervels voelbaar zijn, maar niet als scherpe uitsteeksels. Een schrale ooi weer in conditie krijgen, is niet in een week geregeld. Een ooi kun je ongeveer eentiende conditiescore per week laten aankomen na het spenen ( $\approx 1\text{kg}$  groei/week).

Voorzie schapen jaarrond van mineralen en vitaminen met:

### SCHAPENBROK CONDITIE

- Zeer smakelijke brok met alle belangrijke vitaminen en mineralen.
- Jaarrond te voeren als aanvulling op gras of kuilvoer.
- Draagt bij aan een goede vruchtbaarheid en klauwgezondheid.

Bedoeld voor ooiën in de laatste maand van de dracht en in zoogperiode:

### SCHAPENBROK LACTO

- Bij uitstek geschikt voor melkziekte gevoelige schapenrassen en rassen die veel meerlingen krijgen.
- Extra eiwit, energie en calcium resulteert in goed werkende ooiën rond de geboorte en een probleemloze melkgift.

Benut het groeipotentieel van uw lammeren maximaal met:

### LAMMERENKORREL GROEI

- Voor goede spierontwikkeling van uw lammeren; een hoge maar veilige groei zonder vervetten.
- Met alle toegevoegde mineralen en sporenelementen zoals kobalt.
- Voeradvies na spenen 150 -250g per dag gericht op een groei van 2kg per week.